



Coraz więcej antyszczepionkowców. Iławski Sanepid: na naszym terenie może niedługo wystąpić odra

data aktualizacji: 2019.01.06



W powiecie iławskim cały czas rośnie liczba osób uchylających się od obowiązkowych szczepień ochronnych. Według najnowszych lokalnych danych na koniec trzeciego kwartału 2018 r. w powiecie iławskim były to już 72 przypadki. Dokładny wywiad, zbadanie dziecka i ocena stanu jego zdrowia przez lekarza kwalifikującego do szczepienia- to jeden z czynników, który zmniejsza ryzyko wystąpienia tzw. niepożądanych odczynów poszczepiennych, przypomina szefowa iławskiego Sanepidu. Jolanta Labiś informuje też o prognozach dotyczących konsekwencji unikania szczepień. To m.in. ryzyko powrotu odry.

IŁAWA, POWIAT IŁAWSKI. CORAZ WIĘCEJ ANTYSZCZEPIONKOWCÓW

Wzrost liczby osób, które nie realizują obowiązkowego programu szczepień ochronnych, to trend, który w powiecie iławskim obserwujemy od 2015 roku. Wtedy na naszym terenie było 17 takich przypadków, w 2016r.- 21, w 2017r.- już 57. W 2018 roku również nastąpił wzrost- w powiecie iławskim tylko do końca września (to najnowsze dostępne dane) były 72 osoby uchylające się od obowiązkowych szczepień.

- Większość przypadków odmawiania wykonania szczepień dotyczy dzieci w okresie od urodzenia do 2 roku życia, w tym często są to szczepienia szczepionką skojarzoną przeciwko odrze, śwince oraz różyczce podawane zgodnie z aktualnym Programem Szczepień Ochronnych w 13 - 15 miesiącu życia - mówi Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Iławie Jolanta Labiś.

NOP-Y. BADANIE DZIECKA PRZED SZCZEPIENIEM POWINNO BYĆ DOKŁADNE

NOP- ten skrót często stoi za decyzją rodzica o odmowie wykonania szczepienia. Chodzi o obawy dotyczące wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych.

- Do najczęściej stwierdzanych objawów niepożądanych należą: gorączka, odczyn w miejscu wstrzyknięcia (obrzęk, zaczerwienienie, przemijający ból). Zwykle NOP-y mają łagodny przebieg i ustępują w ciągu kilku dni. Zazwyczaj nie wymagają interwencji lekarza i szczególnego leczenia - informuje szefowa iławskiego Sanepidu. - Ryzyko wystąpienia poważnego niepożądanego odczynu poszczepiennego (NOP) w przypadku wszystkich obecnie stosowanych szczepionek jest wielokrotnie mniejsze niż ryzyko i konsekwencje wynikające z zachorowania na chorobę zakaźną, przed którą chroni szczepienie. Większość poważnych zdarzeń po szczepieniu nie ma związku z działaniem szczepionki, a zbieżność w czasie jest przypadkowa - dodaje.

Ważna jest rola lekarza rodzinnego, kwalifikującego dziecko do szczepienia przed jego realizacją.

- Prawidłowa kwalifikacja dziecka do szczepienia, jaką przeprowadza lekarz sprawujący opiekę profilaktyczną, zmniejsza ryzyko wystąpienia NOP - podkreśla Jolanta Labiś. - Polega ona na dokładnym zebraniu wywiadu, zbadaniu dziecka oraz ocenie jego stanu zdrowia - jest to jedno z podstawowych zadań lekarza kwalifikującego do szczepienia.

Wiarygodne dane na temat rejestrowanych w kraju NOP-ów publikuje, na swojej stronie internetowej <http://www.pzh.gov.pl>, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego Państwowy Zakład Higieny w rocznym biuletynie pt. "Szczepienia Ochronne w Polsce". Ponadto informacje o rodzaju oraz częstości występowania możliwych NOP-ów można znaleźć w ulotce dołączonej do opakowania danej szczepionki oraz w "Charakterystyce Produktu Leczniczego" (ChPL).

WRÓCI ODRA?

Jak informuje Inspekcja Sanitarna, spadek minimalnego stopnia zaszczepienia populacji przeciwko odrze poniżej 95% może być przyczyną szerzenia się przypadków zachorowań wśród osób niezaszczepionych. W 2018 r. w województwie warmińsko-mazurskim zarejestrowano 23 przypadki zachorowań na odrę, w tym 18 osób wymagało hospitalizacji (wcześniej, w 2017 r., nie rejestrowano zachorowań).

- Do dzisiaj w powiecie iławskim nie odnotowano zachorowań, natomiast unikanie szczepień może w niedalekiej przyszłości przyczynić się do wystąpienia odry na naszym terenie - ocenia Jolanta Labiś i informuje o zmianie w programie

szczepień ochronnych, która jest skutkiem takich obaw. - **W związku ze wzrostem zachorowań i potrzebą szybszego uodpornienia dzieci wprowadzono w Programie Szczepień Ochronnych na 2019 rok zmianę dotyczącą przyspieszenia szczepienia dzieci przeciwko odrze (podanie II dawki szczepionki) z 10. roku życia na 6. rok życia.**

Źródło:

<https://www.infolawa.pl/aktualnosci/item/56688-coraz-wiecej-antyszczepionkowcow-ilawski-sanepid-na-naszym-terenie-mo-ze-niedlugo-wystapic-odra>