



Wykryli wirusa H5N8 w powiecie iławskim. Trzeba wybić tysiące zwierząt

data aktualizacji: 2021.04.26



Miejscowość Kantowo w gminie Kisielice, w powiecie iławskim - to jedno z nowych miejsc, gdzie służby weterynaryjne potwierdziły ognisko ptasiej grypy, dowiedział się portal www.infoilawa.pl.

Jest to już 19. ognisko tej choroby na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Wirus H5N8 się rozprzestrzenia, powodując milionowe straty.

Ognisko ptasiej grypy w Kantowie zostało potwierdzone 24 kwietnia. Tego dnia nadeszło sprawozdanie z badań wykonanych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym - Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach dotyczące próbek pobranych od drobiu w gospodarstwie komercyjnym, w którym utrzymywano **36 978 szt. indyka rzeźnego**, zlokalizowanym w miejscowości **Kantowo (gmina Kisielice, powiat iławski)**.

- W badanych próbkach stwierdzono obecność materiału genetycznego wirusa grypy ptaków (AIV)

H5N8 - potwierdzają służby weterynaryjne. - W gospodarstwach wdrożone zostały procedury związane z likwidacją choroby.

Oznacza to konieczność wybicia całego stada oraz dezynfekcji gospodarstwa. Później dopiero po upływie 21 dni od zakończenia odkażania można ponownie umieścić zwierzęta w komercyjnej hodowli.

W związku z tym, że na Warmii i Mazurach potwierdzono w ostatnim czasie kilka ognisk grypy ptaków, można mówić o liczonych w milionach złotych stratach tylko w naszym regionie.

O grypie ptaków - materiały Głównego Inspektoratu Weterynarii

Grypa ptaków jest to niezwykle zakaźna i zaraźliwa choroba wirusowa drobiu, która może powodować śmiertelność do 100%.

Na zakażenie wirusami grypy ptaków podatne są prawie wszystkie gatunki ptaków zarówno domowych (drób), jak i dzikich wolno żyjących, jednak stopień wrażliwości poszczególnych gatunków jest zróżnicowany.

Jak dotychczas nie stwierdzono na świecie ani jednego przypadku zakażenia wirusem HPAI/H5N8 u człowieka i w chwili obecnej nie ma podstaw do wprowadzania ponadstandardowych środków prewencyjnych w odniesieniu do ludzi.

Biorąc jednak pod uwagę ewolucyjne pochodzenie wirusów H5N8 od H5N1 oraz generalnie dużą zmienność wirusów grypy, wskazana jest pewna ostrożność, szczególnie u osób zawodowo mających kontakt z drobiem i ptakami dzikimi.

Wirus szybko ginie w produktach drobiarskich poddanych obróbce termicznej.

Red. kontakt@infoilawa.pl.

Źródło:

<https://www.infoilawa.pl/aktualnosci/item/64196-wykryli-wirusa-h5n8-w-powiecie-ilawskim-trzeba-wybic-tysiace-zwierzat>