



Nieudany obrót zewnętrzny płodu. Kiedy mówimy o błędzie medycznym?

data aktualizacji: 2024.10.20



ECV (ang. External Cephalic Version), czyli obrót zewnętrzny płodu, to zabieg, który skupia się na obróceniu dziecka z położenia pośladkowego do położenia główką w dół po to, by umożliwić tradycyjny poród drogami natury, tym samym rezygnując z przeprowadzenia cesarskiego cięcia. Proces ten przeprowadzany jest na sali porodowej po 36. tygodniu ciąży (37. tygodniu, gdy jest to drugie lub kolejne dziecko), po stwierdzeniu, iż dziecko samoistnie nie obrało prawidłowej pozycji, a szanse, że dokona tego wkrótce są minimalne. Zakłada się, że im bliżej terminu porodu, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że obrót główką w dół nastąpi samoistnie. Chociaż zabieg ECV uznaje się bezpieczny, nie jest całkowicie pozbawiony ryzyka.

Przebieg ECV - czego można się spodziewać?

Zabieg trwa zazwyczaj kilka godzin, jednak sama procedura obracania trwa mniej-więcej 10 minut. Przed wykonaniem obrotu zewnętrznego płodu, konieczne jest wykonanie badania USG, które potwierdzi pośladkowe położenie dziecka. ***Pacjentka podłączana jest także do CTG - monitora***

płodu, który nadzoruje tętno dziecka przez około 30-60 minut, a także otrzymuje lek rozluźniający macicę. Następnie specjalista położnik (bądź inny, wyższą rangą lekarz) naciska swoimi dłońmi na brzuch pacjentki, żeby zachęcić dziecko do wykonania obrotu. Próba może się jednak nie powieść; w takiej sytuacji położnik może spróbować ponownie obrócić dziecko poprzez umiejętny nacisk na brzuch. **Każda próba wykonania obrotu przez doświadczonego lekarza jest naprawdę bezpieczna, dlatego tak ważne jest, by ECV było wykonywane przez osobę specjalizującą się w tego rodzaju zabiegach.** Warto mieć świadomość, że nieudany obrót płodu może skutkować ryzykiem powikłań, do których należą niedotlenienie płodu, zwichnięcie stawów biodrowych, przedwczesne pęknięcie błon płodowych czy odklejenie łożyska. W przypadku wystąpienia dwóch ostatnich sytuacji niezbędne jest natychmiastowe zakończenie ciąży poprzez wykonanie cesarskiego cięcia. **Zabiegu ECV nie powinno się wykonywać w przypadku, gdy: stwierdzono problem z tętnem płodu; wokół szyi dziecka owinięta jest pępowina; dziecko jest chore, nie rozwija się prawidłowo; macica ciężarnej jest nieprawidłowo ukształtowana; poziom płynu owodniowego u dziecka jest mniejszy niż zwykle.**

W przypadku zbyt późnej interwencji medycznej, zignorowania wskazań do wykonania ECV bądź przeprowadzenia zabiegu mimo przeciwwskazań, można podejrzewać wystąpienie poważnego błędu medycznego. Jak zawalczyć o sprawiedliwość?

Nieudany obrót zewnętrzny płodu a błąd medyczny - dochodzenie roszczeń

Nie zawsze oczekiwania wobec lekarzy dotyczące opieki medycznej przekładają się na rzeczywistość. Niezastosowanie się personelu medycznego do procedur postępowania w przypadku braku obrania przez dziecko prawidłowej pozycji, która umożliwia poród siłami natury, może doprowadzić do wystąpienia błędu medycznego, którego konsekwencją może być utrata zdrowia, a nawet życia przez ciężarną lub/i jej dziecko. Konsekwencje nieudanego obrotu zewnętrznego płodu mogą okazać się naprawdę poważne i obejmować wymienione wcześniej powikłania. **W momencie podejrzenia, że doszło do błędu medycznego, nie warto czekać** - zamiast tego należy skontaktować się z doświadczonymi specjalistami, którzy dokładnie przeanalizują sprawę i zaoferują wsparcie w tym trudnym czasie. **Fundacja Ośrodek Pomocy Poszkodowanym** to jedno z miejsc, w których wszyscy doświadczeni błędem medycznym mogą zaczerpnąć fachowej porady. Na stronie prawapacjenta.org znaleźć można niezbędne informacje dotyczące odszkodowania za błąd medyczny, a także skorzystać z bezpłatnej analizy swojego przypadku. Warto walczyć o swoje prawa do odszkodowania i zadośćuczynienia za błąd medyczny, którego skutki można odczuwać przez całe życie.

Materiał partnera.

Źródło:

<https://www.infoilawa.pl/aktualnosci/item/76222-nieudany-obrot-zewnetrzny-plodu-kiedy-mowimy-o-bledzie-medycznym>